

SyrSpend® SF Alka + Omeprazol

Herstellungsanweisung für Herstellset

Zur Herstellung von 6 x 100 ml Omeprazol (2 mg/ml) Suspensionen

Rezeptur

Omeprazol	0,2 g
SyrSpend® SF Alka	6,3 g
Gereinigtes Wasser	ad 100,0 ml

Lagerung der Rezeptur

vor Licht geschützt, im Kühlschrank (2 – 8 °C)

Aufbrauchsfrist

siehe Empfehlung

Herstellungsempfehlung

1. SyrSpend® SF Alka Pulver abwiegen (6,3 g auf 100 ml Suspension) und in ein Gefäß mit geeigneter Volumenmarkierung überführen.
2. Den Wirkstoff, falls erforderlich, in einer Reibschale verreiben bis eine einheitliche, feine Partikelgröße entstanden ist, auf einer geeigneten Wägeunterlage nach Nullstellung der Waage abwiegen und ebenfalls in das Gefäß überführen.
3. Den Wirkstoff mit SyrSpend® SF Alka Pulver gut vermischen.
4. Mit gereinigtem Wasser bis zur Volumenmarkierung auffüllen, das Gefäß fest verschließen und kräftig schütteln.
5. Gegebenenfalls erneut mit gereinigtem Wasser bis zur Markierung auffüllen und durch nochmaliges kräftiges Schütteln homogenisieren.

Empfehlung zur Festlegung der Aufbrauchsfrist

Die Daten in der Kompatibilitätstabelle geben die **physikalische und chemische** Stabilität eines Wirkstoffs in SyrSpend® SF an. Bei der Herstellung von Rezepturen mit SyrSpend® SF muss die Aufbrauchsfrist durch die fachliche Beurteilung des Apothekers, die geltende Gesetzgebung sowie die anerkannten pharmazeutischen Regeln festgelegt werden. Zusätzlich empfiehlt Fagron der herstellenden Apotheke, die hygienischen Bedingungen im Patientenumfeld mit einzubeziehen.

Anwendungsinformationen

- Die Zubereitung muss vor Gebrauch stets gut geschüttelt werden.
- Die in diesem Set enthaltenen Steckensätze sind mit den gängigsten Medizinflaschen (GL18) kompatibel. Vor dem Einsetzen des Steckensatzes ist es notwendig, den Gießring zu entfernen. Der Steckensatz kann in der Flasche verbleiben und muss nicht entfernt werden.
- Nutzen Sie den Dosieraufsatz zur vereinfachten Entnahme der Suspension zusammen mit der im Set enthaltenen Oralspritze. Der Dosieraufsatz kann ebenfalls für die orale Applikation verwendet werden.
- Nach jeder Anwendung muss die Dosierhilfe (Oralspritze und Dosieraufsatz) gründlich mit lauwarmem Wasser gereinigt und anschließend getrocknet werden. Bitte beachten Sie hierzu unseren Leitfaden zur Reinigung von Dosierhilfen.

Haftungsausschluss: Trotz größter Sorgfalt, die Genauigkeit der Dosierungen und Rezepturen zu gewährleisten, erhebt diese Auflistung keinen Anspruch auf Richtigkeit bezüglich Gebrauch, Sicherheit, Effizienz oder Bioverfügbarkeit dieser Empfehlungen. Der Inhalt der Auflistung ersetzt keinesfalls eine (medizinische) Beratung, Empfehlung oder Meinung. Medizinischem Fachpersonal, Ärzten, Rezeptur-herstellenden Apothekern, die diese Informationen nutzen, wird empfohlen, diese ausschließlich anzuwenden, wenn diese nach ihrer eigenen professionellen Meinung und Beurteilung geeignet sind. Fagron übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die dargestellten Rezepturen oder die hierin enthaltenen Informationen.