

---

# SyrSpend® SF

## Allgemeine Herstellempfehlung

---

### Flüssigkeit

1. SyrSpend® SF PH4 flüssig vor der Verwendung schütteln.
2. Die benötigte Menge SyrSpend® SF PH4 flüssig in einem geeigneten Messzylinder abmessen.
3. Den Wirkstoff falls erforderlich in einer Reibschale verreiben bis eine einheitliche, feine Partikelgröße entstanden ist (bei mikronisierten Wirkstoffqualitäten nicht notwendig), dann auf einer geeigneten Wägeunterlage nach Nullstellung der Waage abwiegen und in eine mit Pistill tarierte Fantaschale überführen.
4. Eine kleine Menge SyrSpend® SF PH4 flüssig zugeben und den Wirkstoff unter mehrmaligem Abschaben damit anreiben.
5. Die restliche Menge SyrSpend® SF PH4 flüssig portionsweise zugeben und unter häufigem Abschaben mit dem Ansatz verrühren.
6. Die Suspension unmittelbar nach der Zubereitung in ein Abgabegefäß mit geeigneter Volumenmarkierung abfüllen und gegebenenfalls mit SyrSpend® SF PH4 flüssig bis zur Markierung auffüllen und homogenisieren.

### Pulver

1. SyrSpend® SF Pulver abwiegen und in ein Abgabegefäß mit geeigneter Volumenmarkierung überführen.
  - SyrSpend® SF PH4/ SyrSpend® SF PH4 NEO : 6,5 g auf 100 ml.
  - SyrSpend® SF Alka: 6,3 g auf 100 ml.
2. Den Wirkstoff falls erforderlich in einer Reibschale verreiben bis eine einheitliche, feine Partikelgröße entstanden ist (bei mikronisierten Wirkstoffqualitäten nicht notwendig), auf einer geeigneten Wägeunterlage nach Nullstellung der Waage abwiegen und ebenfalls in das Abgabegefäß überführen.
3. Den Wirkstoff mit SyrSpend® SF Pulver gut vermischen.
4. Mit gereinigtem Wasser bis zur Volumenmarkierung auffüllen, das Gefäß fest verschließen und kräftig schütteln.
5. Gegebenenfalls erneut mit gereinigtem Wasser bis zur Markierung auffüllen und durch nochmaliges kräftiges Schütteln homogenisieren.

**Die Zubereitung sollte vor Gebrauch geschüttelt werden.**

Bei Kindern unter 2 Jahren wird die Verwendung des Pulvers empfohlen.